



REGÍSTRESE
en la Newsletter Diaria
de **DIARIO MEDICO**

DIARIO MEDICO.COM

[INICIO](#) | [ÁREA CIENTÍFICA](#) | [ÁREA PROFESIONAL](#) | [OPINIÓN / PARTICIPACIÓN](#) | [MULTIMEDIA](#)

geriatría

[Portada](#) > [Área Científica](#) > [Especialidades](#) > [Geriatría](#)

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

La impactación fecal afecta al 50% de ancianos en residencias

El primer estudio sobre impactación fecal en el anciano institucionalizado apunta a un factor asociado al estreñimiento no controlado.

Sonia Moreno. Madrid | 09/10/2013 17:20



¡vota!

0 comentarios

imprimir



Alberto López Rocha (Semer) y Enrique Rey (Clínico, de Madrid). (Lenda)

[Ippok](#) la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa

La experiencia de los profesionales de salud ya indicaba que la impactación fecal, o acumulación de heces duras en recto y/o colon, constituye un síndrome geriátrico de importancia, por el deterioro en la calidad de vida del paciente, su efecto en el entorno y cuidadores y las posibles complicaciones, no exentas de gravedad. Sin embargo, pese a que la intuición médica advertía del peso específico de este trastorno en la población anciana, apenas había datos de trabajos científicos. De hecho, el estudio nacional sobre Prevalencia de la impactación fecal en el anciano, que se ha presentado hoy en la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid, es una rara avis en la literatura internacional. "Cuando nos planteamos este proyecto, en 2009, no había nada publicado de estas características a nivel mundial", destaca Enrique Rey, jefe de Servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid), y coordinador del [trabajo](#), junto a Alberto López Rocha, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer)

El estudio epidemiológico, precedido por un estudio piloto publicado en BMC Geriatrics, y que apoyo de Norgine, se ha llevado a cabo sobre casi 700 ancianos de 21 residencias de todo el p

"Realizamos una selección aleatoria de una muestra representativa de los 400.000 ancianos in: España, y recogimos [datos](#) directamente de las personas estudiadas -sobre síntomas de estreñ nutricionales y de actividad física-, así como de las historias clínicas y de enfermería. También : exploración del recto mediante tacto, para determinar la prevalencia en el momento del estudio La edad media de los residentes estudiados fue de 84 años. López Rocha ha apostillado que e supera en dos años a la longevidad nacional, lo que abunda en el buen hacer de las residencia

El 47,3 por ciento de los ancianos institucionalizados sufrieron al menos un episodio de impacta año; casi la tercera parte, el 28,8 por ciento, dos episodios. El estudio también reveló que el 6,6 sujetos en los que se realizó el tacto rectal estaban impactados. Los factores asociados al trast de fármacos administrados, la capacidad física, el uso -esporádico, no regular- de antiinflamato estreñimiento. Rey ha destacado que una persona con estreñimiento controlado tenía diez veces probabilidades de sufrir la impactación, mientras que sin el control, la cifra ascendía a 37. Las n neurológicas, en cambio, no se asociaron en el estudio con la impactación, "probablemente por especial atención en ese aspecto a estos pacientes", reflexiona Rey, que también deduce del [tr](#) conocimiento actual sobre cómo prevenir la impactación es insuficiente. El 70 por ciento de los diagnosticados con estreñimiento y un 63 por ciento de ellos, tratados con laxantes.

Síntomas inespecíficos y variados

La clínica de la impactación fecal es muy variada e inespecífica. Según el documento sobre e presentado en el último congreso de la Semer, en Huesca, "puede manifestarse con malesta síndrome confusional agudo, dolor en parte baja de la espalda, síntomas urinarios y afectació como taquicardia". También, con dolor de características cólicas en hipogastrio, anorexia, vó distensión abdominal.

☆☆☆☆☆ ¡vota! | 0 comentarios imprimir
compartir Twitter 0



HAZ TU COMENTARIO

[Inpook](#) la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa
 Escribe tu comentario

COMENTARIOS

Número de caracteres (500/500)

introduce tu comentario

Usuario logueado

ENVIAR

Condiciones de uso

- Esta es la opinión de los internautas, no de Diario Médico.
- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
- Para cualquier duda o sugerencia, o si encuentra mensajes inadecuados, puede escribirnos a dminternet@unidadeditorial.es

Aviso Legal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados en un fichero propiedad de Unidad Editorial Revistas, SL, empresa editora de Diario Médico y Diariomedico.com con domicilio en Madrid, Avenida de San Luis 25, (28033), a los efectos de poder proporcionarle nuestros servicios. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos personales mediante el correo electrónico dminternet@undiadeditorial.es.

[Elecciones Generales](#) | [Liga Fútbol](#) | [IBEX](#) | [Belleza - Telva](#) | [Belleza - YoDona](#) | [Pisos Bancos](#) | [Apuestas - Jugando Voy](#) | [Ofertas Empleo](#)
[Tiendas Por El Mundo](#) | [Equipaciones Liga](#) | [juegos Ps3](#) | [Blogs De Viajes](#) | [Coches - Marcamotor.com](#) | [Televisión - Veo.es](#) | [Revista Ar](#)
[Mano](#) | [Lotería De Navidad](#) | [Correo Farmacéutico](#) | [DMedicina](#) | [ippok](#) | [Orbyt Smart TV](#) | [Logintegral](#)

[Mapa Web](#) | [Contacto](#)

©2013. Madrid. Unidad Editorial, Revistas

La información que figura en esta página web, está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de Madrid, autoridad competente en la materia, el 10 de junio de 1997.

[Ippok](#) la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa